

医薬品の適正使用に欠かせない  
情報です。必ずお読みください。

2007年1月

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

合成副腎皮質ホルモン剤

**ケナコルト®-A** 筋注用  
関節腔内用  
水懸注40mg/1mL

**KENACORT®-A** INTRAMUSCULAR  
INTRAARTICULAR

トリアムシノロンアセトニド水性懸濁注射液

及び

合成副腎皮質ホルモン剤

**ケナコルト®-A** 皮内用  
関節腔内用  
水懸注50mg/5mL

**KENACORT®-A** INTRADERMAL  
INTRAARTICULAR

トリアムシノロンアセトニド水性懸濁注射液



製造販売元  
**プリストル・マイヤーズ株式会社**  
東京都新宿区西新宿6-5-1

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度合成副腎皮質ホルモン剤 ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL及びケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL（一般名：トリアムシノロンアセトニド）における「使用上の注意」を改訂いたしましたので、ご案内申し上げます。

謹白

改訂の概要（詳細については添付文書をご参照ください。）

「副作用・その他の副作用」の改訂  
「皮膚」の項に「色素脱失」を追記しました。

2006年12月 自主改訂

改訂内容（「使用上の注意」の部分）につきましては、日本製薬団体連合会発行「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 No.156」に掲載されます。

流通在庫の関係から改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまで若干の日数が必要ですので、既にお手元にある製品のご使用に際しましては、この「お知らせ」の内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注40mg/ 1 mL

及び

ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注50mg/ 5 mL

改訂箇所の新旧対比表 (2006年12月改訂 下線部：追加改訂箇所)

改訂後		改訂前	
4. 副作用 (1) 略 (2) その他の副作用 次の症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。		4. 副作用 (1) 略 (2) その他の副作用 次の症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと。	
種類\頻度	頻度不明	種類\頻度	頻度不明
皮膚	痤瘡、多毛、脱毛、色素沈着、皮下溢血、紫斑、線条、掻痒、発汗異常、顔面紅斑、創傷治癒障害、皮膚菲薄化・脆弱化、色素脱失、脂肪織炎	皮膚	痤瘡、多毛、脱毛、色素沈着、皮下溢血、紫斑、線条、掻痒、発汗異常、顔面紅斑、創傷治癒障害、皮膚菲薄化・脆弱化、脂肪織炎

<解説>

国内で色素脱失（脱色素斑及び投与部位の皮膚変色を含む）が累計7件（全て非重篤）報告されたことから追記しました。

医薬品添付文書改訂情報は機構のインターネット情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp/>）にも掲載されています。あわせてご利用ください。