

ソタコール錠 40mg ソタコール錠 80mg

【この薬は？】

販売名	ソタコール錠 40mg SOTACOR TABLETS 40mg	ソタコール錠 80mg SOTACOR TABLETS 80mg
一般名	ソタロール塩酸塩 Sotalol Hydrochloride	
含有量 (1錠中)	40mg	80mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、不整脈治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、心臓に作用し心臓の異常な興奮を抑えて、脈の乱れを整えます。
- ・次の病気の人に処方されます。

生命に危険のある下記の再発性不整脈で他の抗不整脈薬が無効か、または使用できない場合

心室頻拍、心室細動

- ・この薬の使用量はそれぞれの人に依りて調節されます。この薬による不整脈は使用初期ばかりでなく、使用量を増やした時にも起こる可能性がありますので使用量の調節は徐々に行われます。
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を減らしたりすると、狭心症、不整脈、心筋梗塞を誘発するおそれがあります。指示どお

りに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

持続性心室頻拍（動悸、脈が速くなる、息切れ）または心室細動（胸の不快感、胸の痛み、動悸）の人に、トルサードポアン（気を失う、動悸、脈が速くなる）があらわれるという報告があります。他に有用な薬物療法がない心室細動あるいは心室頻拍の人だけに使用されます。

次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・心原性ショックのある人
- ・重度のうっ血性心不全のある人
- ・腎臓に重篤な障害のある人
- ・高度の洞性徐脈のある人
- ・高度の刺激伝導障害のある人
- ・気管支喘息、気管支けいれんのおそれがある人
- ・先天性または後天性のQT延長症候群のある人
- ・過去にソタコール錠に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- ・心筋抑制のある麻酔薬（シクロプロパン等）を使用している人
- ・アミオダロン塩酸塩（注射）、バルデナフィル塩酸塩水和物、モキシフロキサシン塩酸塩またはトレミフェンクエン酸塩を使用している人

次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・基礎心疾患（心筋梗塞、弁膜症、心筋症等）があり心不全をおこすおそれのある人
- ・急性心筋梗塞（発症後2週間以内）後で左室機能不全の人
- ・うっ血性心不全のある人
- ・刺激伝導障害（房室ブロック、洞房ブロック）のある人
- ・高齢の人
- ・腎機能障害のある人
- ・QT延長のみられる人
- ・血清カリウム、血清マグネシウムの低下のある人
- ・洞機能不全症候群のある人
- ・糖尿病のある人
- ・甲状腺中毒症のある人
- ・過去にアナフィラキシーがあった人
- ・乾癬のある人

この薬には併用してはいけない薬[心筋抑制のある麻酔薬（シクロプロパン等）、アミオダロン塩酸塩（注射）、バルデナフィル塩酸塩水和物、モキシフロキサシン塩酸塩、トレミフェンクエン酸塩]や併用を注意すべき薬があります。他の薬

を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	ソタコール錠 40mg		ソタコール錠 80mg	
一回量	開始 1錠	最高 4錠	開始 半錠	最高 2錠
飲む回数	1日2回			

どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合には一回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

多く使用した時（過量使用時）の対応

徐脈、うっ血性心不全、低血圧、気管支けいれん、低血糖、トルサードポアン（気を失う、動悸、脈が速くなる）等の症状があらわれる可能性があります。このような症状があらわれたら、ただちに受診してください。

過量使用の治療薬として、アトロピン、エピネフリン、イソプロテレノール、ノルエピネフリン、アミノフィリン、エアゾル型サルブタモール、硫酸マグネシウム等があります。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用に際しては、心室頻拍または心室細動の再発、あるいは不整脈があらわれることがありますので、心機能検査（脈拍、血圧、心電図検査、心エコー検査、胸部X線検査等）が定期的に行われます。
- ・この薬の使用を急に中止した後に、狭心症、不整脈または心筋梗塞を誘発するおそれがあります。この薬を長期間使用した後に使用を中止する際には徐々に減量されますので、医師の指示なしに使用を中断もしくは中止しないでください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を中止してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいないことを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。



このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
心室細動 しんじつさいどう	胸の不快感、胸の痛み、動悸、眼の前が暗くなる、めまい
心室頻拍 しんじつひんぱく	動悸、脈が速くなる、息切れ
Torsades de pointes トルサード ド ポアン	気を失う、動悸、脈が速くなる、意識がなくなる、胸部違和感、胸の痛み
洞停止 どうていし	気を失う、心臓が止まる、めまい
完全房室ブロック かんぜんぼうしつブロック	めまい、気を失う
心不全 しんぷぜん	横になるより座っている時に呼吸が楽になる、息苦しい、息切れ、全身のむくみ、からだがだるい、動く時の動悸
心拡大 しんかくだい	通常無症状

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	全身のむくみ、からだがだるい
頭部	めまい、意識がなくなる
眼	眼の前が暗くなる
胸部	胸の不快感、胸の痛み、動悸、息苦しい、息切れ、胸部違和感、心臓がとまる、横になるより座っている時に呼吸が楽になる、動く時の動悸
手・足	脈が速くなる
その他	気を失う

【この薬の形は？】

販売名	ソタコール錠 40mg	ソタコール錠 80mg
形状	カプセル型の割線入りの錠剤 	カプセル型の割線入りの錠剤 

長径	10mm	12mm
短径	3mm	4mm
厚さ	3mm	4mm
重さ	0.1g	0.2g
色	微青色	微青色
識別コード	BMS622	BMS621

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ソタコール錠 40mg	ソタコール錠 80mg
有効成分	ソタロール塩酸塩	
添加物	無水乳糖、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、軽質無水ケイ酸、青色二号アルミニウムレーキ	

【その他】

この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

発売会社： Bristol・マイヤーズ株式会社

(<http://www.bms.co.jp>)

メディカル情報部

電話：0120-093-507

受付時間：9：00～17：30

（土、日、祝日並びに当社休日を除く）